

# ねずみ防除

## 殺そ剤の正しい使い方と注意事項

★殺そ剤品名 野そ用殺そ剤 ラテミンリン化亜鉛1%  
(りん化亜鉛系粒剤)

ラテミンリン化亜鉛1%は、約2gごとの特殊防水小袋包装(誘引脂質剤使用)になっており、雨や雪にも耐えられる安全・効力・喫食に優れた殺そ剤です。

★毒性 **普通物**

### ★防除時期



春のねずみ防除は、繁殖期の前に行なうことが効果的です。  
繁殖期前の2月に実施して下さい。

### ★使い方

本剤1小袋(約2g)をそのまま、水田・畑などの畦畔及び農道のねずみの穴(活動している穴)に投入して下さい。

経済的な防除法 (早朝か夕方の防除が最も効果的です。)

- ①穴をふさぐ。 ②穴を掘り返す。 ③薬剤を投入 ④薬剤を食べて死ぬ。



本剤をねずみの穴に投入する2~3日前に、  
各自の圃場のねずみの穴を全部踏みつぶして  
下さい。

2~3日後、新たにねずみの穴が  
出来た所に本剤を投入して下さい。

※投入した本剤を異物反応で外へ出すねずみ  
もいますが、この場合は、再び本剤を投入  
して下さい。



## 安全使用上の注意



- 作業時は、直接手にふれないようゴム手袋などを用いて取り扱い、作業後および直接体に付着した時石ケンでよく洗うこと。
- 薬剤を密封の袋から取出す際は臭いをかがないように注意すること。
- 本剤に酸類が作用すると有害なリン化水素を発生するので、酸類を絶対に近づけないこと。
- 子供や家畜が誤って食べるおそれのあるところでは使用しないこと。
- 処理後、食べ残りの薬剤はできるだけ回収し、土中などに処理すること。
- 誤って飲み込んだ場合は吐き出させ、人工呼吸及び酸素吸入等の応急措置をとると共に、直ちに医師の手当てを受けること。

治療法・・・過マンガン酸カリウム(5000倍)液、または10倍に希釈した過酸化水素水  
によって胃内洗浄を行い、かつ炭酸水素ナトリウムを内服させると有効です。

保管・・・密封し、直射日光をさけ、食品や飼料と区別し、酸類とは隔離し、冷涼・乾燥した所、  
子供の手のとどかない所に厳重に保管すること。

★空袋は、圃場などに放置せず環境に影響のないよう適切に処理すること。

我孫子市植物防疫協会